

Click to verify



CYCLAVANCE® Ciclopiorina líquida Indicado para Câes Cíclicos Ciclopiorina em solução oral para o controle das manifestações clínicas de dermatite atópica em cães. Frascos de 15 mL, 30 mL e 50 mL. FORMULA: Ciclopiorina 100,0 mg. Veículo q.s.p. 1,0 mL. INDICAÇÕES: CYCLAVANCE® é indicado para tratamento e controle do prurido, eritema e outras manifestações clínicas decorrentes da dermatite atópica em cães. PROPRIEDADES: A ciclopiorina é uma substância imunossupressora seletiva, que atua especificamente e reversivelmente sobre os linfócitos T, a interleucina-2 e outras citocinas, promovendo efeitos anti-inflamatórios e antipruríticos. Outras propriedades são a capacidade de inibir a função de apresentação dos antígenos do sistema imune da pele, bloqueando o recrutamento e ativação dos eosinófilos, a produção de citocinas pelos queratinócitos, a função das células de Langerhans, a degranulação dos mastócitos e desta forma a liberação de histamina e citocinas pró-inflamatória. A ciclopiorina administrada por via oral sofre absorção no epitélio do intestino delgado. A concentração máxima (C-max) é atingida aproximadamente 2 horas após a administração oral, na dose de 5 mg/kg (espécie canina) com níveis plasmáticos de 600 a 1200 ng/mL, sendo a biodisponibilidade da molécula de aproximadamente 23% a 45%. A meia-vida média é de aproximadamente 7 a 10 horas em cães, enquanto a eliminação ocorre principalmente via hepática. POSOLOGIA / MODO DE USAR : USO ORAL. Administrar a dose de 0,05 mL de CYCLAVANCE® por kg de peso do animal (essa dose corresponde a 5 mg/kg de ciclopiorina), a cada 24 horas. Recomenda-se a administração do produto duas horas antes ou duas horas após a alimentação. O peso do animal deve ser cuidadosamente aferido antes e durante o tratamento. CONTRAINDICAÇÕES/ PRECAUÇÕES DE USO / EFEITOS ADVERSOS : Não usar o produto em casos de hipersensibilidade à ciclopiorina. Não usar em animais com histórico de neoplasias malignas. Não vacinar os animais durante o tratamento. Recomenda-se um intervalo de pelo menos duas semanas entre a administração de vacinas e o tratamento com a ciclopiorina. ADVERTÊNCIAS: Utilizar em cães a partir seis meses de idade; Não utilizar em fêmeas gestantes; Não utilizar depois de expirado o prazo de validade do produto. Em caso de superdosagem, deve ser realizado o tratamento sintomático, a critério do médico veterinário. PRECAUÇÕES DE USO: A ciclopiorina pode influenciar os níveis de insulina e provocar aumento da glicemia. Portanto, recomenda-se monitorar os níveis de creatinina de cães portadores de doenças renais sejam constantemente monitorados durante o tratamento. Ciclopiorina em solução oral para o controle das manifestações clínicas de dermatite atópica em cães. Frascos de 15 mL, 30 mL e 50 mL. FORMULA: Ciclopiorina 100,0 mg. Veículo q.s.p. 1,0 mL. INDICAÇÕES: CYCLAVANCE® é indicado para tratamento e controle do prurido, eritema e outras manifestações clínicas decorrentes da dermatite atópica em cães. PROPRIEDADES: A ciclopiorina é uma substância imunossupressora seletiva, que atua especificamente e reversivelmente sobre os linfócitos T, a interleucina-2 e outras citocinas, promovendo efeitos anti-inflamatórios e antipruríticos. Outras propriedades são a capacidade de inibir a função de apresentação dos antígenos do sistema imune da pele, bloqueando o recrutamento e ativação dos eosinófilos, a produção de citocinas pelos queratinócitos, a função das células de Langerhans, a degranulação dos mastócitos e desta forma a liberação de histamina e citocinas pró-inflamatória. A ciclopiorina administrada por via oral sofre absorção no epitélio do intestino delgado. A concentração máxima (C-max) é atingida aproximadamente 2 horas após a administração oral, na dose de 5 mg/kg (espécie canina) com níveis plasmáticos de 600 a 1200 ng/mL, sendo a biodisponibilidade da molécula de aproximadamente 23% a 45%. A meia-vida média é de aproximadamente 7 a 10 horas em cães, enquanto a eliminação ocorre principalmente via hepática. POSOLOGIA / MODO DE USAR : USO ORAL. Administrar a dose de 0,05 mL de CYCLAVANCE® por kg de peso do animal (essa dose corresponde a 5 mg/kg de ciclopiorina), a cada 24 horas. Recomenda-se a administração do produto duas horas antes ou duas horas após a alimentação. O peso do animal deve ser cuidadosamente aferido antes e durante o tratamento. CONTRAINDICAÇÕES/ PRECAUÇÕES DE USO / EFEITOS ADVERSOS : Não usar o produto em casos de hipersensibilidade à ciclopiorina. Não usar em animais com histórico de neoplasias malignas. Não vacinar os animais durante o tratamento. Recomenda-se um intervalo de pelo menos duas semanas entre a administração de vacinas e o tratamento com a ciclopiorina. ADVERTÊNCIAS: Utilizar em cães a partir seis meses de idade; Não utilizar em fêmeas gestantes; Não utilizar depois de expirado o prazo de validade do produto. Em caso de superdosagem, deve ser realizado o tratamento sintomático, a critério do médico veterinário. MODO DE CONSERVAÇÃO E VALIDADE: Conservar em local seco, fresco, em temperatura ambiente (entre 15° C e 30° C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Nestas condições, o produto é válido por 2 anos. Após aberto, utilizar em até 6 meses. Ciclopiorina em solução oral para o controle das manifestações clínicas de dermatite atópica em cães. Frascos de 15 mL, 30 mL e 50 mL. Ciclopiorina 100,0 mg. Veículo q.s.p. 1,0 mL. INDICAÇÃO: CYCLAVANCE® é indicado para tratamento e controle do prurido, eritema e outras manifestações clínicas decorrentes da dermatite atópica em cães. A ciclopiorina é uma substância imunossupressora seletiva, que atua especificamente e reversivelmente sobre os linfócitos T, a interleucina-2 e outras citocinas, promovendo efeitos anti-inflamatórios e antipruríticos. Outras propriedades são a capacidade de inibir a função de apresentação dos antígenos do sistema imune da pele, bloqueando o recrutamento e ativação dos eosinófilos, a produção de citocinas pelos queratinócitos, a função das células de Langerhans, a degranulação dos mastócitos e desta forma a liberação de histamina e citocinas pró-inflamatória. A ciclopiorina administrada por via oral sofre absorção no epitélio do intestino delgado. A concentração máxima (C-max) é atingida aproximadamente 2 horas após a administração oral, na dose de 5 mg/kg (espécie canina) com níveis plasmáticos de 600 a 1200 ng/mL, sendo a biodisponibilidade da molécula de aproximadamente 23% a 45%. A meia-vida média é de aproximadamente 7 a 10 horas em cães, enquanto a eliminação ocorre principalmente via hepática. POSOLOGIA / MODO DE USAR : USO ORAL. Administrar a dose de 0,05 mL de CYCLAVANCE® por kg de peso do animal (essa dose corresponde a 5 mg/kg de ciclopiorina), a cada 24 horas. Recomenda-se a administração do produto duas horas antes ou duas horas após a alimentação. O peso do animal deve ser cuidadosamente aferido antes e durante o tratamento. CONTRAINDICAÇÕES/ PRECAUÇÕES DE USO / EFEITOS ADVERSOS : Não usar o produto em casos de hipersensibilidade à ciclopiorina. Não usar em animais com histórico de neoplasias malignas. Não vacinar os animais durante o tratamento. Recomenda-se um intervalo de pelo menos duas semanas entre a administração de vacinas e o tratamento com a ciclopiorina. ADVERTÊNCIAS: Utilizar em cães a partir seis meses de idade; Não utilizar em fêmeas gestantes; Não utilizar depois de expirado o prazo de validade do produto. Em caso de superdosagem, deve ser realizado o tratamento sintomático, a critério do médico veterinário. A ciclopiorina pode influenciar os níveis de insulina e provocar aumento da glicemia. Portanto, recomenda-se monitorar os níveis glicêmicos durante o tratamento. Utilizar em cães a partir seis meses de idade; Recomenda-se que os níveis de creatinina de cães portadores de doenças renais sejam constantemente monitorados durante o tratamento. Efeitos adversos a ocorrência de reações adversas é rara. Efeitos indesejáveis que podem ser observados após a administração do produto são: distúrbios gastrointestinais como salivoreia (salivação intensa), vômito, fezes amolecidas e diarreia. Estes efeitos são brandos e autolimitantes, geralmente não requerem a interrupção do tratamento. Reações menos frequentemente observadas são letargia ou hiperatividade, anorexia, hiperplasia gengival, reações cutâneas (lesões verrucosas, vermelhidão, edema, alterações no pelo), fraqueza muscular e câmbias musculares. Consulte o médico veterinário, caso observe os sintomas acima relacionados. PRECAUÇÕES DE USO: A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em particular o citocromo P450 (CYP 3A4). Em certos casos clinicamente justificáveis, pode ser necessário um ajuste da dose do medicamento. A administração concomitante do produto com outros medicamentos deve ser avaliada criteriosamente pelo médico veterinário. Várias substâncias são conhecidas por inibir competitivamente ou induzir as enzimas envolvidas no metabolismo da ciclopiorina, em

